

## Notations:

- $(E, d)$  espace métrique
- $\mathcal{B}_E$  ou  $\mathcal{B}$  tribu borélienne (+ petite qui contient les ouverts)
- $\mathcal{M}_1(E)$ : mesures de proba sur  $E$
- Si  $f: E \rightarrow \mathbb{R}$  est mesurable  $\geq 0$  ou  $\mu$ -intégrable, on note

$$\mu(f) = \langle \mu, f \rangle = \int_E f d\mu$$

- $\mathcal{C}_b(E)$ : fonctions continues bornées  $E \rightarrow \mathbb{R}$
- $\mathcal{C}_c(E)$ : fonctions continues  $E \rightarrow \mathbb{R}$  à support compact

## Références:

- P. Billingsley, Convergence of probability measures (2nd ed)
- O. Kallenberg, Foundations of modern probability (2nd ed)
- J. Kingman, Poisson processes
- G. Lest, M. Penrose, Lectures on the Poisson process

# Cours 1: Convergence étroite dans $\mathbb{R}^k$

Plan: 1) Définition

2) Restriction des fonctions test

3) Fonctions de répartition, énoncé ( $k=1$ )

4) Fonctions caractéristiques (théorème de Lévy)

## 1) Définition

Définition Soit  $(E, d)$  un espace métrique,  $\mu_n, \mu \in \mathcal{M}_+(E)$ . On dit que  $(\mu_n)$  converge étroitement vers  $\mu$  si

$$\forall f \in C_b(E), \mu_n(f) \rightarrow \mu(f).$$

On note alors  $\mu_n \Rightarrow \mu$

Exemples • Si  $x_n \rightarrow x \in \mathbb{R}^k$ , alors  $\delta_{x_n} \Rightarrow \delta_x$

$$\bullet \mu_n = \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n \delta_{ix} \Rightarrow \text{Lebesgue}([0,1])$$

Formulation probabiliste Si  $X_n, X$  sont des v.a. de lois respectives  $\mu_n, \mu$ , on dit que

$$X_n \xrightarrow{\text{loi}} X \text{ si } \mu_n \Rightarrow \mu, \text{ i.e. } \forall f \in C_b(E), \mathbb{E}[f(X_n)] \rightarrow \mathbb{E}[f(X)].$$


Proposition Soit  $(E, d)$  un espace métrique,  $\mu_n, \mu, \nu \in \mathcal{M}_+(E)$ .

Si  $\mu_n \Rightarrow \mu$  et  $\nu_n \Rightarrow \mu$ , alors  $\mu = \nu$

Preuve: On a alors  $\forall f \in C_b(E), \mu(f) = \nu(f)$

Soit  $F$  fermé et  $K > 0$ . On pose

$$\delta_{F,K}(x) = \max(1 - Kd(x, F), 0)$$



Comme  $f_{F,n}$  converge simplement vers  $f$ , par convergence dominée, on en déduit que  $\mu(F) = \nu(F)$ , et donc  $\mu = \nu$  par le théorème des classes monotones



Dans la suite de ce cours 1, on se restreint à  $\mathbb{R}^k$ , muni de la distance euclidienne.

## 2) Restriction des fonctions test

Théorème ("petit porte-manteau") Soit  $\mu_n, \mu \in \mathcal{M}_+(\mathbb{R}^k)$ . On a :

$\mu_n \Rightarrow \mu$  si  $\forall f: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}_+$ , mesurable, bornée, continue  $\mu$  presque partout (i.e.  $\mu(\{x \in \mathbb{R}^k; f \text{ continue en } x\}) = 1$ ) on a  $\mu_n(f) \rightarrow \mu(f)$

Voir Cours 2 pour une preuve d'un énoncé plus général dans un cadre plus général.

Proposition Soit  $\mu_n, \mu \in \mathcal{M}_+(\mathbb{R}^k)$ . Soit  $H \subset \{ \text{fonctions } \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R} \text{ mesurables bornées} \}$

$A_f \subset C_c(\mathbb{R}^k) \subset H$ , l'adhérence étant prise pour la norme uniforme. Alors

$\forall f \in H, \mu_n(f) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mu(f)$  implique  $\mu_n \Rightarrow \mu$

Preuve : Étape 1 : On mq  $\forall f \in C_c(\mathbb{R}^k) \mu_n(f) \rightarrow \mu(f)$  implique  $\mu_n \Rightarrow \mu$ .

Ide : argument de troncature. Soit  $\gamma_r: \mathbb{R}^k \rightarrow [0,1]$  continue

Soit  $f \in C_b(\mathbb{R}^k)$ . Alors

$$\begin{aligned} \gamma_r(x) &= 1 \text{ pour } \|x\| \leq r \\ \gamma_r(x) &= 0 \text{ pour } \|x\| \geq r+1 \end{aligned}$$

$$|\mu_n(f) - \mu(f)| \leq |\mu_n(f) - \mu_n(f\gamma_r)| + |\mu_n(f\gamma_r) - \mu(f\gamma_r)| + |\mu(f\gamma_r) - \mu(f)|$$

$$\text{Quand } n \rightarrow \infty: \limsup 1^{\text{er}} \text{ terme} \leq \|f\|_\infty (1 - \mu(\gamma_r)) \leq \|f\|_\infty (1 - \mu(\gamma_r))$$

$$\limsup 2^{\text{e}} \text{ terme} = 0$$

Ainsi  $\lim_{n \rightarrow \infty} |\mu_n(f) - \mu(f)| \leq 2 \|f\|_\infty (1 - \mu(\delta_\varepsilon))$

Comme  $\mu(\delta_\varepsilon) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 1$  (par convergence dominée), cela conclut l'étape 1.

Étape 2 Soit  $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}^k)$ . Soit  $g \in \mathcal{H}$  tq  $\|f - g\|_\infty \leq \varepsilon$ . Alors

$$|\mu_n(f) - \mu(f)| \leq \underbrace{|\mu_n(f) - \mu_n(g)|}_{\leq \varepsilon} + \underbrace{|\mu_n(g) - \mu(g)|}_{\xrightarrow{\text{car } g \in \mathcal{H}} 0} + \underbrace{|\mu(g) - \mu(f)|}_{\leq \varepsilon}$$


Donc  $\mu_n(f) \rightarrow \mu(f)$ . On conclut par l'étape 1.



Application: Soit  $\mu \in \mathcal{M}_+(\mathbb{R})$  et  $(X_n)_{n \geq 1}$  des v.a iid de loi  $\mu$ .

Soit  $\mu_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \delta_{X_i}$ . Alors p.s  $\mu_n \Rightarrow \mu$ . En particulier, toute proba de  $\mathcal{M}_+(\mathbb{R})$  est limite étroite de mesures atomiques

Preuve Soit  $(f_k)_{k \geq 1}$  une suite de  $\mathcal{C}_c(\mathbb{R})$  dense dans  $\mathcal{C}_c(\mathbb{R})$ ,

prendre par exemple les polynômes à coefficients rationnels x fonctions plateau  $T_{k,p}$  avec  $i$  

On pose  $\mathcal{H} = \{f_k : k \geq 1\}$

Comme  $\mu_n(f_k) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f_k(X_i) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{p.s}} \mathbb{E}[f_k(X_1)] = \mu(f_k)$  d'après la loi des grands nombres

Donc p.s  $\forall f \in \mathcal{H}, \mu_n(f) \rightarrow \mu(f)$ , d'où le résultat par la prop.



### 3) Fonctions de répartition (k=1) et leur union

Définition Si  $\mu \in \mathcal{M}_+(\mathbb{R})$ , on note  $F_\mu(x) = \mu(-\infty, x]$  pour  $x \in \mathbb{R}$  sa fonction de répartition



Remarques : •  $\lim_{t \rightarrow \infty} F_\mu = 1$ ,  $\lim_{t \rightarrow -\infty} F_\mu = 0$ ,  $F_\mu$  est càdlàg (continue à droite avec des limites à gauche en tout point).

•  $\mu$  a un atome en  $x \Leftrightarrow \Delta F_\mu(x) = F_\mu(x) - F_\mu(x-) = \mu(\{x\}) > 0$

•  $\mu$  a un nombre dénombrable d'atomes (car  $\forall k \geq 1$ ,  $\#\{x \in \mathbb{R}, \mu(\{x\}) \geq \frac{1}{k}\} \leq k$ )


•  $\mu$  n'a pas d'atome  $\Leftrightarrow F_\mu$  est continue

•  $\mu$  a une densité  $g$  (% Lebesgue)  $\Rightarrow F_\mu$  est dérivable

presque partout de dérivée  $g$  et  $F_\mu(x) = \int_{-\infty}^x g(t) dt$ .

⚠  $F_\mu$  est toujours presque partout dérivable, mais n'est pas toujours l'intégrale de sa dérivée (c'est en fait le cas même de  $\mu \ll \text{mes}$  de Lebesgue),

prendre l'exemple du diable / Cantor : (dérivée = 0 presque partout)



Proposition Soit  $\mu_n, \mu \in \mathcal{M}_+(\mathbb{R})$ .

$\mu_n \Rightarrow \mu$  ssi  $F_{\mu_n}(x) \rightarrow F_\mu(x) \forall x \in \mathbb{R}$  et  $\Delta F_\mu(x) = 0$

Preuve : • Si  $\mu_n \Rightarrow \mu$  et si  $\Delta F_\mu(x) = 0$ , alors  $f(x) = \mathbb{1}_{x \leq a}$  est continue  $\mu$ -presque partout, et donc par petit porte-manteau,

$$\mu_n(f) \rightarrow \mu(f)$$

• Réciproquement, on a alors  $\mu_n(g) \rightarrow \mu(g)$  pour toute fonction  $g$  de la forme  $g = \sum_{i=1}^r \alpha_i \mathbb{1}_{]x_i, y_i]}$  avec  $x_i$  et  $y_i$  des non-atomes de  $\mu$ . Or toute fonction de  $\mathcal{C}_c(\mathbb{R})$  est limite uniforme de telles fonctions. On conclut avec la proposition de 2).

Définition On dit qu'une famille  $(\mu_i)_{i \in I}$  de mesures de  $\mathcal{M}_1(\mathbb{R})$  est tendue si  $\forall \varepsilon > 0, \exists A > 0, \sup_{i \in I} \mu_i(\mathbb{R} \setminus [-A, A]) \leq \varepsilon$

Remarque Une suite  $(\mu_n)_{n \geq 1}$  de  $\mathcal{M}_1(\mathbb{R})$  est tendue si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists A > 0, \limsup_{n \rightarrow \infty} \mu_n(\mathbb{R} \setminus [-A, A]) \leq \varepsilon.$$

Ceci provient du fait qu'une mesure  $\mu \in \mathcal{M}_1(\mathbb{R})$  est tendue

$$\text{puisque } \lim_{A \rightarrow \infty} \mu(\mathbb{R} \setminus [-A, A]) = 0$$

Le résultat suivant est un résultat de type "compact" et est un cas particulier du théorème de Prokhorov, qui sera vu au Cours 3.

Théorème Soit  $(\mu_n)_{n \geq 1}$  une suite de  $\mathcal{M}_1(\mathbb{R})$ . Alors

$(\mu_n)_{n \geq 1}$  est tendue  $\Leftrightarrow \forall$  extraction  $\varphi, \exists$  extraction  $\psi$  tq  $(\mu_{\varphi \circ \psi(n)})_{n \geq 1}$  converge étroitement

(par extraction, on veut dire sous-suite, ou, plus formellement, une injection croissante  $\mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ )

Preuve  $\boxed{\Leftarrow}$  Par l'absurde, on suppose  $\exists \varepsilon > 0$  tq  $\forall n \geq 1,$

$$\mu_{\varphi(n)}(\mathbb{R} \setminus [-n, n]) > \varepsilon \quad (\text{on peut prendre } \varphi \text{ croissante car à } i \geq 1 \text{ fixé } \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_i(\mathbb{R} \setminus [-n, n]) = 0)$$

Par hypothèse, soit  $\psi$  extraction tq  $(\mu_{\varphi \circ \psi(n)})_{n \geq 1}$  converge

étroitement vers  $\mu \in \mathcal{M}_1(\mathbb{R})$ . Alors pour tout  $x > 0$  tq  $\mu(\{x\}) = \mu(\{-x\}) = 0,$

pour  $n$  assez grand,  $[-x, x] \subset [-\psi(n), \psi(n)]$ . Donc

$$\mu([-x, x]) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_{\varphi \circ \psi(n)}([-x, x]) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mu_{\varphi \circ \psi(n)}([- \psi(n), \psi(n)]) \leq 1 - \varepsilon.$$

En faisant  $x \rightarrow \infty$ , on obtient  $\mu(\mathbb{R}) < 1$ , absurde.

$\Rightarrow$  Quitte à travailler avec  $\mu \circ \phi^{-1}$ , on suppose  $\phi = \text{id}$ .

Étape 1: identifier une limite potentielle. On pose  $F_n = F_{\mu_n}$

$\forall q \in \mathbb{Q}$ ,  $(F_n(q))_{n \geq 1}$  est borné. Par argument diagonal,  $\exists \varphi$  extraction tq  $\forall q \in \mathbb{Q}$ ,  $(F_{\varphi(n)}(q))_{n \geq 1}$  converge vers une limite notée  $F_\infty(q)$ . On pose alors

$$F(x) = \text{vlg} \{ F_\infty(q) : q > x, q \in \mathbb{Q} \}.$$

On vérifie que  $F$  est croissante, continue à droite.

Soit  $\varepsilon > 0$  et  $A > 0$  tq  $\sup_{n \geq 1} \mu_n(\mathbb{R} \setminus [-A, A]) \leq \varepsilon$ .

Soit  $q \in \mathbb{Q}$ ,  $q > A$ . Alors  $F_n(q) \geq 1 - \varepsilon$

En faisant  $n \rightarrow \infty$ , on obtient  $F_\infty(q) \geq 1 - \varepsilon$ .

D'où  $F(A) \geq 1 - \varepsilon$ .

On montre de même que  $F(-A) \leq \varepsilon$ .

Donc  $\lim_{-A} F = 0$ ,  $\lim_{+A} F = 1$ .

Ainsi  $\exists \mu \in \mathcal{M}_+(\mathbb{R})$  tq  $F = F_\mu$  (c'est la mesure de

Lebesgue-Stieltjes associée à  $F$ , image de la mesure de Lebesgue sur  $\mathbb{R}$  par  $x \mapsto \text{vlg} \{ y \in \mathbb{R} : F(y) \geq x \}$ ,

cf feuille d'exercices)

Étape 2: On vérifie que  $\mu \circ \phi^{-1} \Rightarrow \mu$ .

Soit  $x \in \mathbb{R}$  tq  $\mu(\{x\}) = 0$ . Alors

$$F(x) = \sup \{ F_\infty(q) : q < x, q \in \mathbb{Q} \} = \text{vlg} \{ F_\infty(q) : q > x, q \in \mathbb{Q} \}$$

Ainsi, si  $q < x < q'$  avec  $q, q' \in \mathbb{Q}$ :

$$\begin{aligned} F_\infty(q) &= \lim_{n \rightarrow \infty} F_{\varphi(n)}(q) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} F_{\varphi(n)}(x) \\ &\leq \limsup_{n \rightarrow \infty} F_{\varphi(n)}(x) \\ &\leq \limsup_{n \rightarrow \infty} F_{\varphi(n)}(q') = F_\infty(q'). \end{aligned}$$

En faisant  $q \uparrow x$ ,  $q' \downarrow x$ , on conclut que  $F_{\varphi(n)}(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} F(x)$ .



Remarques. • Il est tentant de reformuler en disant que  $\{\mu_n, n \geq 1\}$  est d'adhérence compact dans  $\mathcal{M}_1(\mathbb{R})$  muni d'une distance qui métrise la convergence étroite. Ceci sera effectivement fait dans le cours mais c'est prématuré à ce stade.

• L'extension à  $\mathbb{R}^n$  est similaire (cf Proposition 5.21 dans Kallenberg)

Definition On dit qu'une famille  $(X_i)_{i \in I}$  de variables aléatoires réelles est tendue si la famille de leurs lois l'est.

Exemple Si  $(X_i)_{i \in I}$  est bornée dans  $L_1$  (i.e.  $\exists C > 0$  t.q.  $\sup_{i \in I} \mathbb{E}|X_i| \leq C$ ) alors  $(X_i)_{i \in I}$  est tendue. En effet,  $\mathbb{P}(|X_i| > A) \leq \frac{\mathbb{E}|X_i|}{A} \leq \frac{C}{A}$ .

Lemme des sous-sous-suites pour les mesures

Soit  $\mu_n, \mu \in \mathcal{M}_1(\mathbb{R})$ . Alors  $\mu_n \Rightarrow \mu$  si  $\forall \varphi$  extraction,  $\exists \psi$  extraction t.q.  $\mu_{\varphi \circ \psi} \Rightarrow \mu$ .

Preuve:  $\Rightarrow$  ok

$\boxed{\Leftarrow}$  Par l'absurde, soit  $\varepsilon > 0$ ,  $f \in \mathcal{C}_b(\mathbb{R})$  et  $\varphi$  extraction t.q.  
 $\forall n, |\mu_{\varphi(n)}(f) - \mu(f)| \geq \varepsilon$ . Par hypothèse,  $\exists \psi$  extraction t.q.  
 $\mu_{\psi(n)} \Rightarrow \mu$ . Alors  $\mu_{\psi \circ \varphi(n)}(f) \rightarrow \mu(f)$ , contradiction.

~

Corollaire: Soit  $(\mu_n)_{n \geq 1}$  une suite de  $\mathcal{M}_1(\mathbb{R})$ ,  $\mu \in \mathcal{M}_1(\mathbb{R})$ .

Alors  $\mu_n \Rightarrow \mu$  ssi  $\begin{cases} (\mu_n)_{n \geq 1} \text{ est tendue} \\ \text{si } \mu_{\varphi(n)} \Rightarrow \nu \text{ pour une extraction } \varphi \text{ et } \nu \in \mathcal{M}_1(\mathbb{R}), \text{ alors } \mu = \nu. \end{cases}$

Preuve:  $\boxed{\Rightarrow}$  Clair

$\boxed{\Leftarrow}$  On raisonne par l'absurde. D'après le lemme précédent,  $\exists \varphi$  extraction t.q.  $\forall \psi$  extraction,  $\mu_{\psi \circ \varphi(n)} \not\Rightarrow \mu$ .  
 Or  $(\mu_{\varphi(n)})$  est tendue, donc  $\exists \psi$  extraction et  $\nu \in \mathcal{M}_1(\mathbb{R})$  t.q.  
 $\mu_{\psi \circ \varphi(n)} \Rightarrow \nu$ . Donc  $\nu = \mu$  par hypothèse, absurde.

En pratique, le corollaire précédent est très utile pour montrer que  $\mu_n \Rightarrow \mu$  comme suit:

① On mq  $(\mu_n)$  est tendue [Tension]

② On prend  $\varphi$  extraction et  $\nu$  t.q.  $\mu_{\varphi(n)} \Rightarrow \nu$ .

On montre que  $\nu = \mu$  en utilisant une propriété qui caractérise une mesure.  
 [Unité de la limite]